Biologie Cellulaire

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Shop

- Cahiers de Biologie + Lexique
- Accessoires de Biologie

Etudier

Visiter [Biologie Maroc](http://www.biologie-maroc.com) pour étudier et passer des QUIZ et QCM en ligne et Télécharger TD, TP et Examens résolus.

Emploi

- CV • Lettres de motivation • Demandes...
- Offres d'emploi
- Offres de stage & PFE

Chimie de la cellule

Macromolécules de la cellule

M^{me} Boutaina BELQAT

INTRODUCTION

- * Analyse chimique d'un broyât de tissu (animal/végétal):
 - * Fraction organique des cellules vivantes est composée de 4 grandes classes de molécules biologiques:
 - * **Protéines**
 - * **Lipides**
 - * **Glucides**
 - * **Acides nucléiques (ADN/ARN).**
 - * Eau
 - * Ions minéraux.

Clé

	Protéine
	Glucide
	Lipide
	ADN
	ARN

Glucides

D-glucose

D-mannose

D-fructose

* Sucres simples (monosaccharides)

* Polymères (polysaccharides).

* Rôles principaux:

* **Energétique**

* **Structural**

* **Métabolique...**

* **Anabolisme des glucides lors du cycle de Calvin (Cellules végétales)**

* **Catabolisme des glucides lors de la glycolyse et du cycle de Krebs**

Glucides

Carbohydrates - Monosaccharides, disaccharides

Carbohydrates:

- Polymères de sucres
- Molécules contenant C, H, O
- Atomes H, le double de C ou O ($C_6H_{12}O_6$)

Monosaccharides

- Les plus simples carbohydrates

- = sucres :

C = 3 = trioses,

C = 4 = tétroses,

C = 5 = pentoses,

C = 6 = hexoses

- Exemples d'héxose : glucose, fructose, galactose (C₆H₁₂O₆)

- Molécules souvent en forme d'anneau formé d'atomes de C et O.

Disaccharides

- **Différents disaccharides pouvant être formés liant différents monosaccharides par des liaisons glycosidiques.**

Disaccharide	Monosaccharide
Maltose	Glucose + Glucose
Lactose	Glucose + Galactose
Sucrose	Glucose + Fructose

- **Réactions de Condensation (réhydratation): 2 monosaccharides liés par des liaisons covalentes ; H_2O est formé.**

Disaccharides

- Réactions d'Hydrolyse (fractionnement par l'eau): les disaccharides sont divisés en 2 monosaccharides par rupture de la liaison glycosidique; Une molécule de H_2O est ajoutée.

Fonctions des monosaccharides et des disaccharides

- **Bonnes sources d'énergie dans les organismes vivants, utilisées dans la respiration pour fabriquer de l'ATP.**
- **Transportable à travers le corps en raison de la solubilité: le glucose est transporté dissous dans le plasma sanguin (animaux), le saccharose est transporté dans la sève (plantes).**

Fonctions des monosaccharides et des disaccharides

- **Bonnes sources d'énergie dans les organismes vivants, utilisées dans la respiration pour fabriquer de l'ATP.**

- **Transportable à travers le corps en raison de la solubilité: le glucose est transporté dissous dans le plasma sanguin (animaux), le saccharose est transporté dans la sève (plantes).**

Classification des Glucides

- * Deux familles:
 - Sucres simples (directement assimilables par l'organisme):
 - Hydrolysés par les enzymes salivaires et digestives.
 - =monosaccharides (Glucose, Fructose, galactose)
 - = disaccharides.
 - Sucres complexes (polysaccharides):
 - Amidon
 - Glycogène (fabriqué par notre organisme (glycogénèse) et stocké au niveau du foie et des muscles. = sucres de réserve de l'homme.

Cellulose microfibrils
in a plant cell wall

Cell walls

Microfibril

0.5 μm

Plant cells

Cellulose molecules

β Glucose monomer

Lipides

* = corps gras insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques.

* Classés en 8 catégories différentes :

* Acides gras,

* Acylglycérols,

* Phosphoglycérides,

* Sphingolipides,

* Glycolipides,

* Polycétides,

* Stérols

* Prénols

* Rôles principaux:

* Structure,

* Réserve d'énergie (lipogenèse),

* Protection...

Glycogène

Globule lipidique

Lipides, oxydés activement et dégradés pour fournir des radicaux acétyles utilisés dans le cycle de Krebs.

Protéines

* = Polymères d'acides aminés aux propriétés diverses qui assurent presque toutes les activités dans la cellule.

* Rôles principaux:

- * Structure,
- * Catalyse,
- * Transport,
- * Signal intra–et extracellulaire.
- * Réserve,
- * Mouvement,
- * Défense

Protéines

* = Polymères d'acides aminés aux propriétés diverses qui assurent presque toutes les activités dans la cellule.

* Rôles principaux:

- * Structure,
- * Catalyse,
- * Transport,
- * Signal intra–et extracellulaire.
- * Réserve,
- * Mouvement,
- * Défense

Les amino acides: formule générale

Les aminoacides ont 3 caractères structuraux fondamentaux:

1= la configuration du C α : asymétrique + centre de chiralité

2= la fonction aminoacide:

-Ionisation

-Formation de la liaison peptidique

3= la nature de la chaîne latérale

Les amino acides: formule générale

Les aminoacides ont 3 caractères structuraux fondamentaux:

1= la configuration du $C\alpha$

2= la fonction aminoacide: -ionisation des groupements fonctionnels
-Formation de la liaison peptidique

3= la nature de la chaîne latérale

Radicaux

- * **20 acides aminés essentiels subdivisés en différentes catégories en fonction de leurs propriétés physico-chimiques:**
 - * **Radicaux hydrophiles (polaires : acide, basique)**
 - * **Radicaux neutres (non polaires)**
 - * **Radicaux soufrés.**

NON POLAIRES

GLYCINE (Gly)

ALANINE (Ala)

VALINE (Val)

LEUCINE (Leu)

ISOLEUCINE (Ile)

MÉTHIONINE (Met)

PHÉNYLALANINE (Phe)

TRYPTOPHANE (Trp ou Try)

PROLINE (Pro)

POLAIRES

SÉRINE (Ser)

THRÉONINE (Thr)

CYSTÉINE (Cys)

TYROSINE (Tyr)

ASPARAGINE (Asn)

GLUTAMINE (Gln)

CHARGÉS

ACIDES

ACIDE ASPARTIQUE (Asp)

ACIDE GLUTAMIQUE (Glu)

BASIQUES

LYSINE (Lys)

ARGININE (Arg)

HISTIDINE (His)

Les amino acides: formule générale

Les aminoacides ont 3 caractères structuraux fondamentaux:

1= la configuration du $C\alpha$

2= la fonction aminoacide: -ionisation des groupements fonctionnels

-Formation de la liaison peptidique

3= la nature de la chaîne latérale

La liaison peptidique est plane, rigide et polaire

polypeptide histidine-cystéine-valine

Chaîne polypeptidique:

- Orientée et,
 - Polarisée
- (2 extrémités de la chaîne, 1 groupement NH₃⁺ terminal libre, 1 groupement COO⁻ libre).

La liaison peptidique est plane

Les 4 atomes de la liaison peptidique ainsi que C_{α} et $C_{\alpha+1}$ sont dans le même plan

Liaison peptidique présente deux caractéristiques essentielles qui conditionnent les propriétés biologiques des protéines:

- Structure plane
- Rigide.

Le carbone asymétrique (-NH₂ et -COOH) offre une rotation libre autour de laquelle les radicaux pivotent librement.

Hierarchisation de la structure des protéines

La structure des protéines est décomposée

- Rotation possible des aa autour des C, la chaîne des aa peut se replier et adopter une conformation tridimensionnelle, les structures II et III.

Fonctions et localisations

Deux catégories principales :

- Protéines de structure

- Protéines enzymatiques (= une enzyme a la même fonction qu'un catalyseur dans une réaction chimique et est hautement spécifique.)

Acides nucléiques

* = Polymères de nucléotides.

* Rôle principal:

* Stockage,

* Transmission de l'information génétique.

* Autres fonctions:

* Structure

* Catalyse

Les acides nucléiques

- **acide désoxyribonucléique**

ADN

ARN

- **acide ribonucléique**

I- Structure des acides nucléiques

I-1- Molécules simples

β -D-Ribose

2-désoxy- β -D-Ribose

Purine

Pyrimidine

Phosphate
inorganique
= Pi

Pyrophosphate
= PPi

Phosphates

Liaison ester

Liaison anhydride d'acides

Sucres: Ribose, désoxyribose

Les carbones du ribose et désoxyribose sont numérotés : 1', 2', 3', 4' et 5' pour ne pas les confondre avec les atomes des bases.

β -D-Ribose
(ARN)

2-désoxy- β -D-Ribose
(ADN)

Bases azotées

Noyau purique, Noyau pyrimidique

Purine

Pyrimidine

Adénine = **6**-aminopurine.

Guanine = **2**-amino-**6**-oxypurine.

Adénine

Guanine

Cytosine = 2-oxy-4-aminopyrimidine.

Uridine = 2,4-dioxypyrimidine.

Thymidine = 2,4-dioxy-5-

méthylpyrimidine.

Cytosine

Uracile

Thymine

Phosphate
inorganique
= Pi

Phosphates

Pyrophosphate
= PPi

Acide
phosphorique

Liaison ester

Acide

Acide

Liaison anhydride d'acides

Nucléosides

BASE + SUCRE = NUCLÉOSIDE

Dans chaque cas, les molécules de ribose et de désoxyribose sont liées aux bases par une liaison dite : **N-glycosidique** entre le **C-1** du glucide et **un** des atomes d'azote de la base.

- Si la base est **purique**, la liaison se fait avec le **N-9** de la base.
- Si la base est **pyrimidique**, la liaison se fait avec le **N-1** de la base.

Nucléotides

BASE + SUCRE + PHOSPHATE = NUCLÉOTIDE

Nomenclature des unités nucléotidiques

Bases	Nucléosides	Nucléosides 5'-mono, di, triphosphates	Unités nucléotidiques des acides nucléiques
A = Adénine	(désoxy-) adénosine	AMP, ADP, ATP dAMP, dADP, dATP	(d-) adénylate
G = Guanine	(désoxy-) guanosine	GMP, GDP, GTP dGMP, dGDP, dGTP	(d-) guanylate
C = Cytosine	(désoxy-) cytidine	CMP, CDP, CTP dCMP, dCDP, dCTP	(d-) cytidylate
U = Uracile	uridine	UMP, UDP, UTP	uridylate
T = Thymine	désoxy- thymidine	dTMP, dTDP, dTTP	d-thymidylate

L'adénosine triphosphate est un nucléotide composé. Sa structure comporte une **base azotée** (l'adénine), liée par une liaison **N-osidique** au **β -D-ribose** et trois **phosphates**.

Adénosine Tri Phosphate

L'ARN est un polymère de ribonucléotides puriques et pyrimidiques reliés par des ponts 3', 5'-phosphodiester

- Le **RNA natif** existe sous forme d'une molécule à un brin (**monocaténaire**) contrairement à l'ADN.
- Cependant, étant donné la séquence des bases complémentaires appropriées avec une polarité opposée, l'unique brin de RNA est capable de se replier sur lui-même pour former une épingle à cheveux (voir plus loin) ;
- il acquiert ainsi les caractéristiques de la **structure bicaténaire**.

Dans tous les organismes procaryotes et eucaryotes, **3 classes principales de molécules de RNA** sont produites par **transcription de l'ADN**. On distingue selon leurs fonctions :

- **rRNA** (~ 80%) = acide ribonucléique **ribosomique**, qui participe à la structure des ribosomes ;
- **tRNA** (~ 15%) = acide ribonucléique de **transfert**, transporteur des acides aminés activés pour la traduction ;
- **mRNA** (~ 5%) = acide ribonucléique **messenger**, produit de la transcription d'un gène qui porte l'information à traduire.

II-1-1- Différentes classes d'ARN

II-1-1-1- ARN messenger

La classe de mRNA est la plus **hétérogène**.
L'ARN messenger servant de matrice pour la synthèse des protéines, la taille de la molécule dépend de la longueur de la ou des chaîne(s) polypeptidique(s) pour laquelle il code.

Les différents ARNm d'une cellule sont donc hétérogènes quant à la population de molécules qui les représentent et quant à leur séquence nucléotidique.

Les mRNA sont monocaténaire et complémentaires du brin moule de leurs gènes structuraux respectifs

II-1-1-2- ARN de transfert

- Elles servent de molécules adaptatrices pour la traduction en acides aminés spécifiques de l'information contenue dans la séquence nucléotidique du mRNA ; les codons mRNA ne reconnaissant pas directement les acides aminés qu'ils déterminent.

Il existe au moins 20 molécules de tRNA dans chaque cellule, une pour chacun des 20 acides aminés requis pour la synthèse des protéines.

- Même si les tRNA diffèrent les uns des autres par leurs séquences nucléotidiques, ils possèdent plusieurs caractéristiques en commun, notamment une **conformation tridimensionnelle** repliée ressemblant à une **feuille de trèfle**.
- La séquence nucléotidique de toutes les molécules de tRNA (structure I^{aire}) permet un vaste repliement dont la cohésion est assurée par **l'appariement des bases complémentaires** entre certains des résidus nucléotidiques de la même chaîne (structure II^{aire}).

II-1-1-3- ARN ribosomique

- Les ARN d'un ribosome sont appelés ARN ribosomiques (ou ARNr) et, comme les ARNm, ils sont transcrits à partir d'un des brins d'un gène.
- Les ARNr ne portent pas d'information, mais ils sont capables de reconnaître et de s'unir à d'autres molécules, d'apporter un support structural et de catalyser la réaction chimique permettant de réunir les acides aminés.

Dans tous les organismes procaryotes et eucaryotes, **3 classes principales de molécules de RNA** sont produites par **transcription de l'ADN**. On distingue selon leurs fonctions :

- **rRNA** (~ 80%) = acide ribonucléique **ribosomique**, qui participe à la structure des ribosomes ;
- **tRNA** (~ 15%) = acide ribonucléique de **transfert**, transporteur des acides aminés activés pour la traduction ;
- **mRNA** (~ 5%) = acide ribonucléique **messenger**, produit de la transcription d'un gène qui porte l'information à traduire.

* **Éléments minéraux**

- **- Les macro-éléments**

- **2 types :**

- **Cations = ions chargés positivement : Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+**

- **Anions = ions chargés négativement : Cl^- , PO_4^{3-} (surtout HPO_4^{2-} et H_2PO_4^-), HCO_3^- , SO_4^{2-}**

- **On distingue classiquement :**

- **Éléments majeurs :**

- **C, H, O, N (P, S) des molécules organiques ;**

- **P, S, Na, Cl, Mg, K, Ca des sels minéraux ;**

- **Oligoéléments**

- **= Éléments présents en très petites quantités dans l'organisme (cuivre, du cobalt, du manganèse, du zinc, du fer, du fluor, du silicium, du molybdène, du chlore...)**

Chapitre II

La membrane plasmique

Pr. Boutaina BELQAT

I- Définition

- = **membrane biologique** très fine (75 Å de diamètre), de structure asymétrique, dont la fonction fondamentale :
- délimiter le milieu intracellulaire,
- le maintenir constant et,
- le séparer du milieu extracellulaire.

Figure 1. Aspect trilamellaire des membranes.
Micrographie électronique montrant la structure en trois assises

II– Isolement des membranes plasmiques et composition chimique

- L'isolement des membranes plasmiques par les techniques d'ultracentrifugation ne permet pas d'en étudier la composition biochimique avec précision à cause de la **présence de débris d'organites**.
- Les **hématies** sont utilisées, comme matériel d'étude, en raison de la simplicité de leur structure; ils sont **dépourvus de noyau** et d'**organites cytoplasmiques**.

II-1- Isolement des membranes des érythrocytes

Globules rouges humains qui sont le plus employés (collectés en grandes quantités par les banques du sang).

- Lavage des globules rouges dans une solution saline isotonique (NaCl 9‰, tamponné à pH 7,0 ou légèrement alcalin),

- Centrifugation

- Remise en suspension du culot de cellules ainsi obtenu dans un milieu hypotonique (solution tamponnée de NaCl à 5‰ ou moins).

II-1- Isolement des membranes des érythrocytes

- Les globules gonflent puis 15 secondes après le début de ce choc osmotique, de petits trous de 200 à 300 Å de diamètre se font dans la membrane plasmique.
- Dans ces conditions le hyaloplasme riche en hémoglobine sort des globules et se dilue dans le milieu hypotonique extracellulaire; les globules se vident ainsi de leur contenu. C'est le phénomène d'hémolyse.
- Après cette hémolyse les trous se referment et par centrifugation et lavages successifs on sédimente un culot de membranes plasmiques appelées **fantômes de globules rouges**

Équilibre

Entrée massive

Sortie massive

Isolement des membranes des érythrocytes

Figure 2. Isolement et observation de membranes plasmiques de globules rouges.

II-2- Analyse chimique des membranes plasmiques

- 40% de lipides
(phospholipides,
glycolipides...)

- 60% de protéines
(dont les glycoprotéines)

II-2-1- Les lipides

- Ce sont les constituants des corps gras (= combinaison d'alcools et d'acides gras).
- Les lipides membranaires sont **amphiphiles**:
 - un **pôle hydrophile** (extrémité soluble dans l'eau) et ,
 - un **pôle hydrophobe** (extrémité formée d'atomes de carbone et d'hydrogène, insoluble dans l'eau).

Les lipides sont essentiellement des lipides phosphorés ou **phospholipides** et du cholestérol en proportions variables suivant les types cellulaires et les espèces étudiées.

c'est une molécule complexe formée de choline (une substance basique), de phosphate, de glycérol et de deux chaînes d'acide gras. La choline et le phosphate forment l'extrémité hydrophile de la molécule, les deux chaînes d'acide gras forment l'extrémité hydrophobe.

II-2-2- Les protéines membranaires

- Importantes par leur taille (30 à 50 fois plus volumineuses que les lipides; PM compris généralement entre 20000 et 215000),
- elles représentent 50% de la masse de la membrane.
- Elles n'ont pas de pôle, mais deux **extrémités hydrophiles**.
- Tout au long de la protéine alternent des zones hydrophiles et hydrophobes en fonction de la nature des acides aminés qui les constituent.

III- Organisation moléculaire

- E. Corter et F. Grendel supposèrent que les membranes cellulaires étaient composées d'une **double couche de molécules lipidiques**.
- Ils firent éclater des globules rouges et séparèrent l'hémoglobine des membranes.
- Puis ils effectuèrent une dissolution des lipides membranaires dans l'acétone.
- Quand on mélangeait cette préparation avec de l'eau, les lipides remontaient à la surface et s'épandaient en une pellicule d'une seule épaisseur de molécules.
- La surface de cette monocouche lipidique correspondait au double de la surface des membranes plasmiques des globules rouges utilisés.

les lipides de la membrane plasmique forment une couche bimoléculaire.

Surface = S

Membrane plasmique:
double couche de
molécules lipidiques.

Surface = 2S

acétone

Modèle de Davson et Danielli (1935)

- Les membranes cellulaires seraient composées :
 - d'une double couche de lipides encadrée,
 - par deux couches de protéines.

Figure. Structure trilamellaire des membranes (trois feuillets: deux feuillets sombres de 20Å de part et d'autre d'un feuillet clair de 35Å).

(Microscope électronique, grossissement X 150000)

S.J. Singer et G. Nicolson (1972)

Les protéines membranaires sont **dispersées** et **individuellement insérées** dans la **bicouche lipidique** et seules leurs **parties hydrophiles** émergent suffisamment pour entrer en contact avec l'eau.

Modèle de la mosaïque fluide (membrane = une mosaïque constituée d'une double couche fluide de phosphoglycérolipides dans laquelle flottent des molécules protéiques)

Modèle de la mosaïque fluide

(a)

(b)

(c)

(A)

double
couche
lipidique
(5 nm)

molécule lipidique

molécule protéique

(B)

V- Régulation des échanges entre la cellule et le milieu externe

- La membrane plasmique agit à la manière d'une **barrière semi-perméable** entre le compartiment cellulaire et l'environnement extracellulaire.
- Sa perméabilité doit être suffisamment sélective pour permettre:
 - l'entrée des molécules essentielles (glucose, acides aminés...),
 - le rejet des déchets du métabolisme,
 - le transit, dans les deux sens, d'ions spécifiques assurant les concentrations ioniques intracellulaires qui diffèrent fortement de la composition ionique des liquides extracellulaires.
- Les échanges entre la cellule et son environnement se font:
 - soit par **perméabilité** à travers la membrane pour les **petites molécules** = **perméabilité membranaire** ou **transport transmembranaire**,
 - soit par **voie vésiculaire** pour les grosses

V-1- Perméabilité transmembranaire

Toutes les substances ne traversent pas la barrière membranaire sans restrictions:

- La cellule a la capacité d'admettre de nombreuses variétés de petites molécules et de refuser son accès à d'autres.
- Toutes les substances ne traversent pas la membrane à la même vitesse.

V-1- Perméabilité transmembranaire

V-1-1- Participation des

- Le caractère hydrophobe de la partie interne de la phase lipidique bimoléculaire fait d'elle une barrière **imperméable** à la plupart des molécules polaires (hydrophiles).
- Les études expérimentales effectuées sur des membranes artificielles constituées d'une couche bimoléculaire de phospholipides ont montré que :
 - ☀️ Toute molécule diffuse à travers la membrane si le temps lui est donné,
 - ☀️ **La vitesse de diffusion** varie en fonction de la taille des molécules et de leur solubilité dans l'huile (les molécules hydrophobes, comme les hydrocarbures et l'oxygène, se dissolvent dans la membrane et la traversent aisément.
 - ☀️ De deux molécules également solubles dans les lipides, c'est la plus petite des deux qui traversera la

Toute molécule diffuse à travers la membrane si le temps lui est donné

V-1- Perméabilité transmembranaire

V-1-1- Participation des lipides

Le gradient obéit aux lois du **gradient des concentrations** (tendance à l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane).

H₂O, petite molécule non chargée, et les petites molécules hydrophobes d'un PM faible pénètrent dans la cellule par **simple diffusion physique**, les molécules en solution migrant **des zones de forte concentration vers celles de faible concentration.**

V-1- Perméabilité transmembranaire

V-1-2- Participation des protéines

Le transport des **petites molécules non liposolubles** se fait grâce à des **protéines transmembranaires spécialisées**, chacune étant responsable du transfert d'un type de molécules ou d'un groupe de molécules étroitement apparentées.

Les protéines de transport appartiennent à l'une des catégories suivantes:

- Les protéines de type **uniport**
(une seule molécule ou un seul ion dans un sens ou dans l'autre)
- Les protéines de type **symport**
(deux substances de nature différente dans la même direction)
- Les protéines de type **antiport**
(deux substances de nature différente dans la même

V-1-3- Déplacement des substances à travers les membranes cellulaires

Fondamentalement ce déplacement peut emprunter deux voies :

- Une **voie passive**, par **diffusion**, si la molécule transportée n'est pas chargée ; dans ce cas, seul le **gradient de concentration** détermine la direction du transport qui est dit **transport passif**, et
- une **voie active**, par un mécanisme de transport nécessitant de l'énergie, si le soluté porte une charge nette (cas des ions) ; son transport est alors influencé par le **gradient de concentration** mais aussi par le **gradient électrique** à travers la membrane (potentiel de membrane) ; dans ce cas, le transport est dit **transport actif**.

TRANSPORT PASSIF

TRANSPORT ACTIF

Diffusion simple

Diffusion facilitée

A travers la bicouche lipidique A travers un canal aqueux dans une protéine

Liaison avec un transporteur

Dépense d'énergie et liaison avec un transporteur

MEMBRANE

Concentration élevée

Extérieur

Intérieur

Concentration faible

V-1-4- Diffusion de l'eau à travers les membranes

L'osmose

- L'**osmose** est un phénomène physique passif qui se produit seulement si les solutions sont séparées par une **membrane semi-perméable**. Elle est influencée par des solutés qui sont trop gros pour traverser la membrane.
- Seul le **solvant** (eau) peut alors **traverser** la membrane du côté **hypotonique** (le moins concentré) vers le côté **hypertonique** (le plus concentré) jusqu'à ce que les solutions soient **isotoniques** (de même concentration).

Figure 14. Osmose. Deux solutions de glucose de concentrations différentes sont séparées par une membrane perméable au solvant mais imperméable au soluté. La forme en U du récipient facilite l'observation des changements de volume.

VI-2- Transport par voie vésiculaire

La pénétration de gros matériaux extracellulaires par des vésicules cytoplasmiques peut s'effectuer de deux façons distinctes, la **phagocytose** et l'**endocytose***

VI-2- Transport par voie vésiculaire

La pénétration de gros matériaux extracellulaires par des vésicules cytoplasmiques peut s'effectuer de deux façons distinctes, **la phagocytose** et l'endocytose

(pinocytose)*

* : La terminologie a subi un remaniement au cours des dernières années. En 1963, Christian de Duve introduisait le terme **endocytose**, terme général qui regroupait les deux types d'activités, l'ingestion de particules solides (phagocyte) ou la pénétration de liquides et solutés (pinocytose). Actuellement, le terme pinocytose est devenu inhabituel, et le terme « endocytose » est devenu d'usage commun pour **décrire la prise du liquide et des molécules dissoutes ou en suspension** et elle se distingue de la phagocytose. → →

VI-2-1-1- La phagocytose

Elle correspond à l'ingestion de **grosses particules solides** dont la taille peut atteindre plusieurs micromètres.

VI-2-1-2- L'endocytose

- Correspond au prélèvement d'une **gouttelette** (diamètre < 0.1 microns) d'un **liquide extracellulaire** contenant ou non des petites molécules.
- On peut diviser grossièrement l'endocytose en deux catégories :
 - **l'endocytose en vrac** et,
 - **l'endocytose par récepteur interposé**. L'**endocytose par récepteur interposé (ERI)** aboutit à la capture de molécules extracellulaires spécifiques (ligands) après leur liaison à des récepteurs de la surface externe de la membrane plasmique.

Endocytose en vrac =

capture non spécifique de liquides extracellulaires sans aucune reconnaissance par la surface membranaire.

Endocytose par récepteur interposé =

processus hautement spécifique grâce à des récepteurs, protéines transmembranaires amphiphiles, groupées en des régions déterminées de la membrane, qui reconnaissent sélectivement une substance donnée.

Clathrine

Chapitre III

LE CYTOSOL et LE CYTOSQUELETTE

Pr. Boutaina BELQAT

Structure d'une cellule eucaryote animale

I- Définition 1: LE CYTOPLASME

- = **matériel biologique** contenu entre la membrane plasmique et la membrane nucléaire.
- = phase liquide qui contient de nombreux organites et des structures en suspension.
- = cytosol + cytosquelette + organites

I- Définition 2: LE CYTOSOL

- = **phase liquide** où baignent les organites cytoplasmiques, tels que :
- Le noyau
- Le réticulum endoplasmique rugueux
- Le réticulum endoplasmique lisse
- L'appareil de Golgi
- Les ribosomes
- Les différentes vacuoles
- Les mitochondries et,
- Les chloroplastes (chez les plantes).

Le cytosol est limité par la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire et contient des substances solubles comme des **protéines**, des **enzymes** et de l'**ARN**.

I- Structure du cytosol

- En microscopie électronique, il apparaît granuleux alors qu'en microscopie optique il paraît optiquement vide. On peut des fois y différencier des globules lipidiques et des particules de glycogène qui disparaissent après avoir fourni de l'énergie utilisée par la cellule.
- Le **pH** de la phase soluble est proche de la neutralité. Avec ses macromolécules en suspension dans un milieu aqueux salé, le cytosol présente une viscosité 4 fois supérieure à celle de l'eau et correspond à un gel colloïde.

Composition biochimique

- Phase liquide ou semi-liquide
- Gel colloïde 4 fois plus visqueux que l'eau
- pH 7,0
- 85% d'eau

- Ions : Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Mg²⁺
- Gaz : O₂, CO₂
- Molécules simples : lipides, glucides, acides aminés ...
- Macromolécules : Protéines, polysaccharides, acides nucléiques ...

Les **graisses** et le **glycogène** sont stockés dans des vésicules sécrétoires

Les **nutriments** qui ne sont pas utilisés immédiatement pour la production d'ATP sont **stockés** sous une forme qui les rend **visibles au microscope optique**.

Les **inclusions** sont des **réserves** qui ne se trouvent pas dans toutes les cellules.

Inclusions de lipides dans les cellules adipeuses

- Figure 1. Micrographie en microscopie électronique montrant des inclusions de lipides

Particules de glycogène:

Stockées, visibles sous forme de **granules** ou de **grappes** dans le cytosol.

Figure 2. Micrographie en microscopie électronique montrant des grains de glycogène dans une cellule humaine. G : grains de glycogène ; M : mitochondrie ; C : cytosol.

II – Rôles et activités physiologiques

- Le cytosol est considéré comme étant le **carrefour des voies métaboliques** ; il intervient dans l'**anabolisme** et le **catabolisme** des **glucides**, des **acides aminés**, des **acides gras** et des **nucléotides**.
- **Trois grands types d'activités** sont associés aux **composants** du cytosol :
 - La **prise en charge du métabolisme intermédiaire** par les **enzymes** ;
 - La **synthèse des protéines** par les **ribosomes** ; et
 - Le **stockage de graisses**, de **glycogène** et de **vésicules sécrétoires**

II-1- Prise en charge du métabolisme intermédiaire

- Le **métabolisme intermédiaire** = l'ensemble des **réactions chimiques intracellulaires** qui interviennent dans la dégradation, la transformation et la synthèse de **petites molécules organiques**, comme les sucres simples, les acides aminés et les acides gras.
- La **totalité du métabolisme intermédiaire** a lieu dans le **cytosol**. Des milliers d'enzymes qui interviennent dans la **glycolyse** et dans d'autres **voies du métabolisme intermédiaire** sont localisées dans le **cytosol**.
- Les voies métaboliques qui concernent la molécule de **glucose** sont particulièrement importantes car elles concernent la **production d'énergie cellulaire (ATP)**.

II-2- Synthèse des protéines par les ribosomes

Les **ribosomes libres**, dispersés dans le cytosol **synthétisent** les **protéines utilisées** dans le **cytosol même**.

Par contre les **ribosomes du RER** synthétisent les **protéines** qui sont destinées à la **sécrétion** et à la formation de **nouveaux constituants cellulaires**.

LE CYTOSQUELETTE

I- Définition

Le **cytosquelette** est un réseau de **filaments protéiques** variés, attachés à la membrane plasmique et à différents organites.

Il existe dans le cytoplasme de toutes les **cellules eucaryotes**.

Il fournit à la cellule une ossature lui permettant le **maintien de sa forme** et **l'exécution de ses mouvements**.

Les cytosquelettes de tous les eucaryotes sont assez similaires (bien que des différences importantes existent entre les cellules animales et végétales)

Cytosquelette des cellules animales

Cytosquelette des cellules végétales

Le cytosquelette des procaryotes

Récemment découverts chez les procaryotes, les cytosquelettes semblent organisés de façon tout à fait différente de ceux des eucaryotes.

Les travaux de certains chercheurs, notamment ceux de Rut Carballido-López et de son équipe, ont récemment mis en évidence la présence d'un **cytosquelette** chez les **procaryotes**.

Ces chercheurs ont découvert la **protéine Mreb**, homologue à la protéine d'actine, et de structure similaire, localisée sous la membrane et semblant jouer un rôle important dans la structure et la forme cellulaire.

II- Composition et Structure globale du cytosquelette

Le cytosquelette des eucaryotes est formé de **trois structures** filamenteuses bien définies qui forment ensemble un **réseau interactif** élaboré :

Fibres résistantes
(diverses protéines de structure semblable)

composés d'une protéine, la **tubuline**

sont formés d'**actine**

Structure globale du cytosquelette

- Microtubules : Tubuline
- Filaments intermédiaires: fibres protéiques de structure semblable
- Microfilaments: filaments d'actine

Ces filaments protéiques sont **unis** à :

- des protéines motrices qui organisent les fibres du cytosquelette et à,
- des protéines associées qui interviennent dans la réalisation de l'organisation structurale des fibres du cytosquelette.

Chez les **végétaux**, la forme de la cellule étant principalement définie par l'interaction pression osmotique/résistance de la paroi, on constate une moindre importance du cytosquelette : absence de microfilaments d'actine et de filaments intermédiaires (sauf au niveau du noyau).

Seul le réseau de **microtubules** est **développé**. Il est plaqué contre la membrane (Fig. 7) et on pense qu'il intervient dans le sens de synthèse des fibres de cellulose de la paroi squelettique

Cytosquelette des cellules animales

Cytosquelette des cellules végétales

Chez les végétaux, la forme de la cellule étant principalement définie par l'interaction pression osmotique/résistance de la paroi, on constate une moindre importance du cytosquelette : → → →

Filaments intermédiaires

Fonctions du cytosquelette

(1) Structure et support

(2) Transport intracellulaire

(3) Contractilité et motilité

(4) Organisation spatiale

(1) Filament d'actine

(2) Microtubules

(a) Cellule épithéliale

(b)

(c)

Cellule en division

Figure 9.1 Aperçu général de la structure et des fonctions du cytosquelette. Représentation schématique (a) d'une cellule épithéliale, (b) d'une cellule nerveuse et (c) d'une cellule en division. Les microtubules des cellules épithéliale et nerveuse servent surtout de soutien et de moyen de transport pour les organites, tandis que la cellule en division produit le fuseau mitotique indispensable à la

ségrégation des chromosomes. Les filaments intermédiaires apportent un soutien structural aux cellules épithéliale et nerveuse. Les microfilaments supportent les microvillosités de la cellule épithéliale et font partie intégrante du mécanisme impliqué dans l'élongation de la cellule nerveuse et dans la division cellulaire.

Rôle du cytosquelette de l'hématie

- Maintien de la forme discoïdale biconcave
- Plasticité des hématies
- Déformation des hématies dans la lumière des capillaires de $4 \mu\text{m}$ de $\emptyset$

II-4- Les microtubules

II-4-1- Structure et composition

= **Structures cylindriques creuses** présentes dans presque toutes les cellules eucaryotes.

- ➡ Diamètre d'environ 24 nm,
- ➡ Paroi épaisse d'environ 5nm
- ➡ Longueur peut atteindre la longueur ou la largeur d'une cellule.

La **paroi** du microtubule est composée de **protéines tubulaires** disposées en rangées longitudinales = **protofilaments**, alignés parallèlement au grand axe du tubule (Fig. 8.9a).

(a) 100 nm

(b)

(c)

(d) Suture

La **paroi** du microtubule est composée de **protéines tubulaires** disposées en rangées longitudinales = **protofilaments**, alignés parallèlement au grand axe du tubule (a,d).

(a) 100 nm

(b)

(c)

(d)

En coupe transversale, les microtubules montrent **13 protofilaments** disposés en cercle dans la cellule (b).

(a) 100 nm

(b)

(c)

(d)

Chaque **protofilament** est lui-même constitué de deux hétérodimères de **tubuline** :

- tubuline-alpha α
- tubuline-beta β

reliés par des liaisons non-covalentes.

(a) 100 nm

(b)

(c)

(d)

Les deux sous-unités de tubuline ont la même structure tridimensionnelle, s'adaptent l'une à l'autre (c) et sont réparties linéairement le long des protofilaments (d).

Ils font partie de structures très diverses:

Le fuseau achromatique d'une cellule en division

Ils font partie de structures très diverses:

L'axe des cils et flagelles.

II-4-2- Les protéines associées

- Il existe des **protéines associées aux microtubules** ou **MAP**, les unes ont un rôle dans la stabilisation des microtubules, les autres sont spécialisées dans le mouvement des vésicules et des organites le long des microtubules ; ce sont des ATPases :
 - Les kinésines et,
 - Les dynéines qui transportent des vésicules dans des sens opposés.

- Actin
- Microtubules
- Microtubule Associated Proteins
- Molecular Motor Proteins
- Ion Channels
- Neurotransmitter Receptors
- Neurotrophin Receptors
- Ribosomes mRNA

II-4-3- Rôle des microtubules

II-4-3-1- Les microtubules = supports structuraux

La **répartition** des microtubules est généralement en rapport avec la **forme** de la cellule.

II-4-3-2- Rôle des microtubules dans le transport cytoplasmique

Les déplacements cellulaires se font avec la concurrence entre:

- Les microfilaments d'actine et
- les microtubules.

II-4-3-3- Rôle des microtubules dans la mobilité cellulaire

Spermatozoïdes

Protozoaire (Paramécie)

II-4-4- Les centres organisateurs des microtubules

II-4-4- Les centres organisateurs des microtubules

II-4-4- Les centres organisateurs des microtubules

Un **centriole** est formé de 9 groupes de 3 microtubules.

(b)

Un système central et des rayons associent les différents groupes de microtubules.

De plus, les microtubules internes sont reliés aux microtubules externes d'un autre groupe.

(a)

II-4-5- Les cils et les flagelles

Au microscope électronique les **cils** et les **flagelles** eucaryotes apparaissent, en coupe transversale sous forme d'un arrangement caractéristique de type **9+2**, c'est à dire **9 doublets** de microtubules formant un cercle autour de **2 microtubules** centraux.

Le **centre organisateur** (corpuscule basal), est un arrangement **9+0**.

Figure 9.33 Corpuscules de base et axonèmes de cils ou de flagelles. (a) Micrographie électronique d'une coupe longitudinale dans les corps de base de plusieurs flagelles à la surface apicale de cellules épithéliales d'un oviducte de lapin. (b) Schéma illustrant les

relations structurales entre les microtubules du corps de base et de l'axonème d'un cil ou d'un flagelle (a : *Dû à l'obligeance de R. G. W. Anderson*).

II-1-2- Les microfilaments

Les microfilaments sont de minces structures pleines, formées de sous-unités globuleuses d'une protéine, l'actine. Ils sont appelés aussi de ce fait, filaments d'actine et sont retrouvés en grande quantité dans les fibres musculaires.

Ils ont un diamètre d'environ 8 nm, et leur longueur peut atteindre 17 μm .

En présence d'ATP, les monomères d'actine se polymérisent pour former un filament rigide composé de deux brins enroulés l'un autour de l'autre en double hélice.

Les microfilaments sont de deux types :

Les tonofilaments

(Kératines constituant de fins filaments)

(rigidité)

Les myofilaments

(faisceaux de molécules de myosine ou d'actine)

II-1-3- Les filaments intermédiaires

= polymères stables formés de **protéines fibrillaires** assemblées de façon hélicoïdale.

- Taille intermédiaire entre les **microfilaments** d'actine et les **microtubules**.

Maintien de la forme cellulaire & ancrage des **organites**.

LA MITOCHONDRIE

Chapitre IV

Pr. Boutaina BELQAT

I- Définition

- = organites présents dans toute les cellules aérobies.
L'ensemble = le chondriome.
- sont limitées par une enveloppe constituée de deux membranes,
- contiennent de l'ADN.
- Elles mettent en réserve, sous forme d'ATP, l'énergie libérée par l'oxydation enzymatique des molécules nutritives.
- Elles interviennent dans le **stockage** de l'**énergie** et dans son **transport** sur les lieux où la cellule en a besoin.

II- Structure et morphologie en microscopie optique

- Les mitochondries peuvent être aisément isolées par ultracentrifugation, purifiées et fractionnées en leurs différents constituants qui peuvent ainsi être analysés.

II-1- Forme

Photographie en microscopie photonique montrant la forme en bâtonnets des mitochondries (coloration au vert Janus).

II-2- Répartition des mitochondries dans la cellule

- Les mitochondries se répartissent, bien souvent, uniformément dans le cytosol.
- Mais, c'est la fonction de la cellule qui conditionne leur localisation ;
- Elle dépend des besoins énergétiques locaux.

II-2-1- Selon la localisation des substrats à oxyder

Au cours du jeûne, les glucides diminuent et les mitochondries font appel aux lipides, oxydés alors activement et dégradés pour fournir des radicaux acétyles utilisés dans le cycle de Krebs.^{11/08/12}

II-2-2- Selon les besoins en ATP de certaines régions d'une cellule

- La fonction de la cellule conditionne leur localisation ; elle dépend des besoins énergétiques locaux :
 - dans le muscle, elles se placent en regard des myofibrilles.
 - dans le spermatozoïde humain, elles se placent au niveau de la pièce intermédiaire.

III- Ultrastructure

membrane
interne

membrane
externe

crête
mitochondriale

Matrice

Micrographies en microscopie électronique montrant en (a) l'ultrastructure de la paroi des mitochondries et en (b) une petite portion d'une crête mitochondriale portant à la surface interne de ses membranes des particules élémentaires

III- Ultrastructure des membranes mitochondriales

Membrane externe:

- 60% de protéines
- 40% de lipides

Membrane interne:

- 80% de protéines
- 20% de lipides

IV-2-2- Les protéines

- **Protéines de transport** (perméabilité très sélective);
- Protéines intervenant dans les **réactions d'oxydation** de la chaîne respiratoire;
- Complexe enzymatique, **l'ATP-synthétase** assurant, à partir de l'ADP, la fabrication d'ATP dans la matrice mitochondriale.

IV-4- La matrice mitochondriale

- La matrice est constituée d'une substance fondamentale finement granuleuse. Elle renferme :
 - des molécules d'ADN et d'ARN ;
 - des mitoribosomes ;
 - toutes les enzymes impliquées dans la réplication, la transcription et la traduction de l'ADN mitochondrial ;
 - de gros granules riches en cations (Ca^{++} , Mg^{++} , Na^+ , K^+) ;
 - toutes les enzymes impliquées dans le **cycle de Krebs** et la **β -oxydation**.

V- Activités physiologiques

- Les cellules vivantes ont besoin d'un approvisionnement constant en intermédiaires énergétiques, comme l'ATP, pour accomplir leurs activités consommatrices.
- Les organismes peuvent fabriquer l'ATP en dégradant des molécules organiques fournies par l'alimentation (protéines, glucides, lipides).

Les premières étapes de leur dégradation ont lieu dans le cytosol

- Les protides sont transformés en acides aminés (catabolisme) dont une certaine partie donne du pyruvate .
- les glucides, dont la majorité fournissent, par glycolyse, du pyruvate.
- Les lipides, constituent une réserve importante d'énergie. Par le processus de la lipolyse, ils sont dégradés en acides gras qui pénètrent dans les mitochondries.
- La dégradation des nutriments se réalise grâce au mécanisme de la **Respiration**.

Inspiré par les **poumons**, l' **O_2** passe dans la **circulation sanguine** qui le délivre aux **cellules** de l'organisme, principalement celles des muscles lors d'un exercice.

Par le même circuit, le **CO_2** produit par les cellules en activité est rejeté dans l'**atmosphère**.

A l'intérieur des cellules, l' **O_2** est acheminé dans la **mitochondrie**.

Là, les **acétates** fournis par les **acides gras** ou le **glucose** sont décarboxilés et déshydrogénés dans le **cycle de krebs**.

Les **H_2** libérés alimentent la **chaîne respiratoire** et sont acceptés par l' **O_2** pour former de l' **H_2O** , en libérant de l'**ATP**.

L'**ATP** est utilisé par le muscle pour se contracter.

Ces différentes voies métaboliques sont dites **aérobies**.

V-1- Etapes de la respiration

- La dégradation des nutriments se réalise grâce au mécanisme de la **respiration**. La respiration est le processus par lequel la cellule produit de l'énergie nécessaire pour ses activités.
- Au cours de ce mécanisme, qui a lieu dans la mitochondrie, il y a absorption d'**oxygène** et dégagement du **dioxyde de carbone**.
- La respiration se déroule en trois étapes :
 - **La glycolyse**
 - **Le cycle de Krebs ou cycle de l'acide tricarboxylique**
 - **La chaîne de transport d'électrons ou chaîne respiratoire**

V-1-1- La Glycolyse

La glycolyse ne nécessite pas d'oxygène.

Au cours de ce processus, on assiste à des réactions d'oxydoréduction au cours desquelles un **accepteur d'électrons** (coenzyme NAD) est réduit :

et à la synthèse d'ATP par phosphorylation de l'ADP qui produit 4 molécules d'ATP, mais en nécessite 2

- Les produits nets de la glycolyse sont donc :
- 2 ATP (phosphorylation au niveau du substrat)
- 2 NADH + 2 H⁺
- 2 pyruvates

V-1-2- Oxydation des substances au cours du cycle de Krebs

- En présence d'**oxygène**, le **pyruvate** rentre dans la mitochondrie pour être oxydé et relâcher l'énergie au cours du cycle de Krebs.
- Avant que le cycle de Krebs ne commence, il se produit une étape intermédiaire durant laquelle :
 - Un groupement carboxyle est arraché au pyruvate et relâché dans le cytosol sous forme de **CO₂**.

- Il se forme l'**acide acétique**, après la réduction du **NAD⁺** en **NADH + H⁺**.
- Le radical **acétyl** de l'**acide acétique** se lie avec le **coenzyme A (Co A)** pour produire l'**acétyl-CoA**.

Acide pyruvique 3C

Cytosol

Matrice (mitochondrie)

oxaloacetate 4C

citrate 6C

Cycle de Krebs

isocitrate 6C

fumarate 4C

CO_2
 α -ketoglutarate 5C

succinate 4C

CO_2
succinyl CoA 4C

Le cycle de Krebs (matrice)

- = séquence organisée de réactions enzymatiques avec, l'**acide oxaloacétique**, comme substrat **initial** et produit **terminal** :
- L'**acétyl-coenzyme A** cède le radical acétyl **CH₃CO** à l'**acide oxaloacétique** (4C) pour produire le **citrate** (6C).
- Le **citrate** est **progressivement décomposé** jusqu'à l'**acide oxaloacétique**.
- Ces oxydations transforment **chaque** radical acétyl en 2 molécules de CO₂, 8 atomes d'hydrogènes, et 8 électrons.

Les ions hydrogène arrachés aux substrats sont repris par des accepteurs, des **coenzymes**:

le **NAD** (nicotinamide – adénine – dinucléotide)

Le **FAD** (flavine – adénine – dinucléotide)

- En termes énergétiques, c'est le résultat le plus important du cycle parce que ces coenzymes réduites servent à produire, au cours de la **phosphorylation oxydative**, la plus grande partie de l'énergie dérivée de la molécule de glucose initiale.

Cycle de Krebs

2 tours du cycle pour chaque molécule de glucose

- Pour chaque tour du cycle :
- **2 carbones** entrent sous la forme réduite de l'**acétyl-CoA** ;
- **2 carbones** ressortent complètement oxydés sous la forme de **CO₂** ;
- **3 molécules de NAD⁺** sont réduites en **NADH + H⁺** et **1 molécule de FAD** est réduite en **FADH₂** ;
- **1 molécule d'ATP** est produite par la **phosphorylation au niveau du substrat.**

Le bilan énergétique du cycle de Krebs

- pour les 2 molécules de pyruvates:
 - 6 NADH + 6 H⁺
 - 2 FADH₂ + 2 H⁺
 - 2 ATP

V-1-3- Chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative

- Les coenzymes réduites (NADH, FADH₂) cèdent leurs électrons à haute énergie à des transporteurs localisés dans la membrane interne de la mitochondrie.
- L'ensemble de ces transporteurs, assemblés dans l'ordre exact de leurs interactions, constitue la **chaîne respiratoire**.

- La **chaîne de transport des électrons** est une suite de molécules fixées sur la **membrane interne de la mitochondrie** qui sont disposées dans un **ordre décroissant d'affinité pour les électrons**.
- Les **électrons** provenant des coenzymes réduits **se déplacent** le long de la membrane sur la chaîne de transport.
- Les électrons, en se déplaçant, **font sortir des protons** (H^+) dans l'espace intermembranaire de la **mitochondrie**.
- L'accumulation de protons fait fonctionner l'**ATP synthétase** (une pompe à protons) qui utilise le reflux de protons pour fabriquer de l'ATP.

- Le **NADH** passe ses électrons à la flavoprotéine (FMN) qui les passe à une série de molécules (y compris les cytochromes).
- Le **FADH₂** donne ses électrons à la chaîne à un niveau d'énergie **plus bas** que le NADH.
- Les **électrons** sont transmis jusqu'à l'**accepteur final** qui est l'**oxygène** moléculaire, qui accepte en même temps des protons **2H⁺** pour former de l'**eau** (molécule stable).
- Ainsi, c'est pendant cette étape que l'oxygène est consommé.

- Le passage des électrons d'un transporteur à un autre, libère de **l'énergie** à chaque étape.
- Cette **énergie** permet d'assurer le **transport** des protons **H⁺** depuis la **matrice** jusqu'à la **face externe** de la **membrane interne**. Le **pH** de la matrice s'abaisse.
- La **membrane interne** devient **électronégative** sur la face **matricielle** et **électropositive** sur la face en rapport avec la **chambre externe**.

Phosphorylation oxydative

Le flux d'hydrogène active l'enzyme ATP synthétase qui fabrique de l'ATP à partir d'ADP et de phosphore inorganique.

Le chloroplaste

Pr Boutaina BELQAT

Les plastes

- Les plastes sont des organites cytoplasmiques caractéristiques des cellules végétales. Certains sont colorés:
 - les chloroplastes qui renferment en abondance des pigments verts ou chlorophylle, reponsable de la photosynthèse.
 - les chromoplastes qui renferment des pigments de nature variables autres que la chlorophylle et notamment des carotéroides.

Leucoplastes

= Catégorie de plastés non pigmentés (incolores).

- Localisation dans les racines et dans les tissus **non photosynthétiques**.

- Pouvant se spécialiser pour stocker des réserves de :

- amidon = amyloplastés

- lipides = oléoplastés

- protéines = protéinoplastés

Interconversions possibles des plastes

Agrandir

Le chloroplaste

- Les chloroplastes sont des plastes qui doivent leur couleur verte à la **chlorophylle**.
- Ils sont le siège des phénomènes de photosynthèse = processus permettant aux végétaux verts d'effectuer la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique.

I-1- Structure des chloroplastes

- Microscope photonique : forme souvent lenticulaire, de 3 à 10 μm de diamètre et de 1 à 2 μm d'épaisseur.
- Nombre par cellule, fixé génétiquement (30 - 50).
- Existents dans les tissus verts des fleurs, des fruits, des tiges jeunes et des feuilles.

Cellules chlorophylliennes

I-2- Ultrastructure

- Microscope électronique:

- Enveloppe composée de deux membranes:

- Membrane plastidiale externe

- Membrane plastidiale interne.

- Intérieur comprenant un ensemble de membranes photosynthétiques disposées en sacs aplatis = thylakoïdes ou lamelles.

Figure 1. Dessin schématique d'un chloroplaste montrant la double membrane externe et les membranes thylakoïdales.

I-2- Ultrastructure

- Certains thylakoïdes s'empilent pour former des **grana**.
- **Stroma** = Solution riche en protéines qui baigne les thylakoïdes dans le chloroplaste.
- Lamelles d'un chloroplaste en continuité, entourant et délimitant une cavité unique.

Figure 2. Structure interne d'un chloroplaste. Micrographie électronique d'un chloroplaste.

La membrane interne est disposée en piles de thylakoïdes physiquement séparés de la membrane externe (Lester K. Shumway)

I-2- Ultrastructure

- Certains thylakoïdes s'empilent pour former des **grana**.
- **Stroma** = Solution riche en protéines qui baigne les thylakoïdes dans le chloroplaste.
- **Lamelles** d'un chloroplaste en **continuité**, entourant et délimitant une cavité unique.

Protéines	40% à 35% du poids sec
Lipides	25% à 35% du poids sec
Chlorophylles	8% du poids sec
Caroténoïdes	4,5% du poids sec
ADN	0,5% du poids sec
ARN	2 à 3% du poids sec

1-4-Les pigments photosynthétiques

- Pigments = molécules qui absorbent certaines longueurs d'onde particulières de la lumière; ils apparaissent donc colorés.

- Deux types toujours présents dans les chloroplastes: les chlorophylles et les caraténoïdes.
- Les chloroplastes sont verts parce qu'ils contiennent la chlorophylle = pigment qui réfléchit et transmet la lumière verte, mais qui absorbe les autres couleurs.

- 1 - Extraction et séparation des pigments
- - Les chlorophylles et les caroténoïdes sont **liposolubles** (solubles dans des solvants de nature lipidique) et peuvent donc être séparés.
- Extraction des pigments bruts
- - La feuille est broyée dans de l'alcool absolu ou de l'acétone.
- - Les pigments solubles dans les solvants organiques sont extraits.
- - Après filtration (élimination des débris cellulaire) obtention d'une solution brute de pigments.
 - Séparation des différents pigments de la solution brute.

- Chromatographie sur papier (méthode qualitative)
- - Dépôt d'une goutte de pigments bruts sur une feuille de papier.
- - Mise en place de la feuille de papier dans un réceptacle hermétique rempli d'un solvant approprié.
- - Le solvant monte dans la feuille par capillarité en entraînant les pigments de manière différentielle selon leur affinité avec le solvant.
- On peut distinguer ainsi deux catégories principales de pigments :

- les chlorophylles

- les caroténoïdes

Deux parties distinctes:

I-4-1- La chlorophylle

Noyau complexe
(tétrapyrrolique)

ayant un ion
(Mg^{2+}) central

= site actif

(Energie
lumineuse
piégée) =
Hydrophile

«Queue»
apolaire.

Chlorophylle :
bipolaire.

Molécules de chlorophylle incluses dans la membrane

Granum

Membrane du thylacoïde

chlorophylle

- - Pigments présents chez toutes les plantes vertes = groupe important de pigments accessoires.

I-4-2- Les caroténoïdes

- = pigments jaunes et oranges qui absorbent la lumière verte.

- - Coloration masquée par celle de la chlorophylle.

I-5- Systèmes photochimiques

- **Seule la chlorophylle a peut convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Les autres pigments absorbent aussi la lumière mais cèdent leur énergie à la chlorophylle a.**
- La chlorophylle forme deux complexes avec les membranes des thylakoïdes:
 - Le complexe chlorophylle aI, qui absorbe directement les radiations de longueur d'onde supérieure à 680 nm (rouge).
 - Le complexe chlorophylle aII, qui absorbe directement l'énergie mais reçoit aussi de l'énergie absorbée par les autres pigments (chlorophylle b et caroténoïdes) à une longueur d'onde inférieure à 680 nm.
- Quand la lumière frappe un photosystème, n'importe quel pigment excité transmet l'énergie à la molécule de chlorophylle a du **photosystème I ou II.**

I-6- Fonction physiologique : la photosynthèse

- Photosynthèse = l'ensemble des phénomènes qui participent à l'élaboration des glucides chez les végétaux verts.
- Grâce aux pigments et surtout à la chlorophylle a, le chloroplaste absorbe l'énergie lumineuse et la transforme en énergie chimique (ATP).
- L'ATP servira par la suite à la synthèse de nouveaux sucres qui pourront être stockés sous forme d'amidon.

Photosynthèse

- 5 facteurs nécessaires:
- Lumière
- Dioxyde de carbone
- Eau
- Chlorophylle
- Enzymes

Les végétaux sont autotrophes:

ils synthétisent leur propre matière organique à partir de substances minérales qu'ils puisent dans le sol ou dans le milieu aquatique (eau et sels minéraux).

Formule générale de la photosynthèse

Deux périodes

successives:

- Phase lumineuse
- Phase obscure.

1- Phase lumineuse :

- Au niveau des grana.
- Conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique.
- Oxydation de l'eau apportée à la plante et production d'oxygène.
- Apparition, par phosphorylation, de l'ATP et de la NADPH₂ qui seront utilisés pour la réduction du gaz carbonique au cours de la phase obscure.

2- La phase obscure (cycle de Calvin)

- Stroma.
- Production de l' O_2 absorbé, grâce au NADPH₂ et à l'ATP formés au cours de la phase lumineuse.
- Réduction du CO_2
- Elaboration des glucides.

1. Phase lumineuse (réactions photochimiques)

- La phase lumineuse regroupe les phénomènes qui dépendent directement de la lumière.
- Les réactions photochimiques incluent les étapes de la photosynthèse qui convertissent l'énergie solaire en énergie chimique.
- La lumière est émise sous forme de particules appelées photons.
- Chaque photon possède une quantité déterminée d'énergie.
- Ainsi, dans toute réaction photochimique, le processus primaire est l'absorption d'un photon par une molécule réagissante.

1.1. Photolyse de l'eau et réduction de NADP⁺

- La lumière absorbée par la chlorophylle déclenche un transfert d'électrons et de protons de l'eau vers un accepteur, le NADP, qui stocke temporairement les électrons riches en énergie.
- La molécule d'eau se trouve scindée suivant la réaction:
 - $\text{H}_2\text{O} \text{ ----- } 2\text{H}^+ + 2\text{électrons} + 1/2\text{O}_2$
 - La paire d'électrons et les deux protons ($2e + 2\text{H}^+$) sont éventuellement acceptés par le NADP⁺ qu'ils réduisent :

1.1. Photolyse de l'eau et réduction de NADP⁺

- La **lumière** absorbée par la **chlorophylle** déclenche un transfert d'électrons et de protons de l'eau vers un accepteur, le **NADP**, qui stocke temporairement les électrons riches en énergie.

- La molécule d'eau se trouve scindée suivant la réaction:
$$\text{H}_2\text{O} \text{ ----- } 2\text{H}^+ + 2\text{électrons} + 1/2\text{O}_2$$

- La paire d'électrons et les deux protons ($2e + 2H^+$) sont éventuellement acceptés par le $NADP^+$ qu'ils réduisent :

1.2. Captation de l'énergie lumineuse par les pigments et photophosphorylation

- Sous l'effet de l'énergie lumineuse, la chlorophylle a (sous ses deux formes PSI, PSII) émet un électron riche en énergie qui quitte la molécule et est recueilli par la chaîne de transporteurs d'électrons, nommée "chaîne photosynthétique" qui capte les électrons et les amène successivement jusqu'à la surface externe de la membrane des thylakoïdes.
- La chaîne photosynthétique accumule des protons dans les cavités des thylakoïdes pour former un réservoir de protons.
- Ensuite, l'énergie emmagasinée dans le réservoir de protons est utilisée par l'ATP-synthétase pour catalyser la formation d'ATP. Ce processus s'appelle la photophosphorylation. Le transport des électrons excités peut se faire selon deux trajets : cyclique ou non cyclique.

1.2. Captation de l'énergie lumineuse par les pigments et photophosphorylation

- Sous l'effet de l'énergie lumineuse, la chlorophylle a (sous ses deux formes PSI, PSII) émet un électron riche en énergie qui quitte la molécule et est recueilli par la chaîne de transporteurs d'électrons, nommée "**chaîne photosynthétique**" qui capte les électrons et les amène successivement jusqu'à la surface externe de la membrane des thylakoïdes.

- La chaîne photosynthétique accumule des protons dans les cavités des thylakoïdes pour former un réservoir de protons.
- Ensuite, l'énergie emmagasinée dans le réservoir de protons est utilisée par l'ATP-synthétase pour catalyser la formation d'ATP. Ce processus s'appelle la photophosphorylation. Le transport des électrons excités peut se faire selon deux trajets : cyclique ou non cyclique.

C. Prof.

1.2.1. Transport cyclique d'électrons

- Le transport cyclique d'électrons est le trajet le plus simple. Il ne fait intervenir que le photosystème I et n'engendre que de l'ATP; il ne produit ni NADPH + H⁺ ni oxygène.
- Cette voie est dite cyclique parce que les électrons excités qui quittent la chlorophylle du photosystème I finissent par y revenir.

1.2.2. Transport non cyclique d'électrons

- Fait intervenir les **2 photosystèmes I et II** et il s'établit un courant continu d'électrons entre l'eau et le NADP⁺.
- - Les électrons éjectés du **photosystème II** se font remplacer par des électrons retirés de l'eau.
- - Les **électrons excités** du photosystème II descendent une chaîne de transport d'électrons jusqu'au photosystème I, en fournissant l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP.
- - L'excitation du photosystème I propulse des électrons riches en énergie qui rejoignent le NADP⁺ et le réduisent en NADPH + H⁺.
- - La production d'ATP au cours du transport non cyclique d'électrons est appelée photophosphorylation non cyclique. Les produits nets du transport non cyclique d'électrons sont l'ATP, le NADPH + H⁺ et l'oxygène qui diffuse à l'extérieur de la cellule puis de la plante.

- - L'énergie lumineuse provoque l'excitation et le départ d'un électron d'une molécule de chlorophylle du photosystème II.
- - Pour compenser cette perte, ce dernier récupère un électron à partir de la photolyse de la molécule d'eau:
- $H_2O \rightarrow 2 H^+ + 1/2 O_2 + 2e^-$ (Photolyse de l'eau)
- - Il y a production d' O_2 , d'ATP et de NADPH et H^+ .
- C'est donc l'eau qui est le donneur d'électron et le $NADP^+$ qui est l'accepteur final;
- l' O_2 , libéré dans l'atmosphère, est utilisé dans la respiration cellulaire.

2- Phase obscure: **cycle de Calvin** = Phase de fixation du carbone

- = Phase enzymatique permettant la synthèse de sucres, utilisant le **CO₂** (air) comme source de C.
- **Stroma.**
- Commence avec le **CO₂** et une molécule à 5C, le **RuP**, qui réagissent pour former deux molécules à 3C **APG** (phosphoglycérate).
- Chaque molécule d'**APG** utilise 1 **ATP** et 1 **NADPH + H⁺** pour se convertir en **PGAL** (phosphoglycéraldéhyde).
- Une 3ème **ATP** est nécessaire pour phosphoryler le ribulose phosphate pour régénérer la molécule de départ, le ribulose diphosphate.

• Equation globale :

6 tours du cycle de Calvin = production de l'équivalent d'une molécule de glucose .

Phase obscure

Biologie cellulaire

M^{me}Boutaina BELQAT

BIOLOGIE CELLULAIRE= connaissance de la cellule

Petite Histoire de la Biologie Cellulaire

1665 : Robert Hooke découvre des cellules dans du liège en utilisant les premiers microscopes.

1677 : Antoine van Leeuwenhoek, connu pour ses améliorations du microscope, observe le poivre ce qui l'amène à la découverte accidentelle d'**animalcules**, connus aujourd'hui sous le nom de protozoaires.

1838 : Matthias Jakob Schleiden (botaniste) et en 1839 : Theodor Schwann (zoologiste) découvrent que **les plantes et les animaux sont tous faits de cellules**, concluant que la cellule est l'unité commune de structure et de développement, ce qui fonda la **théorie cellulaire**.

1858 : Louis Pasteur réfute la **génération spontanée**, croyance selon laquelle des formes de vie peuvent apparaître spontanément.

1858 : Rudolph Virchow affirme que les cellules naissent du résultat de la division cellulaire (« omnis cellula e cellula »)

Microscope utilisé par Hooke
et la coupe de liège qu'il avait
observé

Protozoaire

Proto (premier)

-zoa (animal)

= **protistes** (organismes **eucaryotes** **unicellulaires**) hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose.

La cellule unique des Protozoaires est plus complexe que la **cellule animale** typique.

Toutes les fonctions nécessaires à la vie animale sont remplies par cette cellule unique.

LE CONCEPT CELLULAIRE

- Énoncé en 1838 par **Schwann** et **Schleiden**.
- En terme général la **théorie cellulaire** = la cellule est l'unité de vie (tout ce qui est vivant est cellulaire) et contient des organites dans son intérieur.
- Concept facilement accepté par les microscopistes sauf ceux du système nerveux qui persistaient à penser que c'était un "continuum" (une continuité) : une structure sans compartiments séparés.
- **Ramon y Cajal** à partir de 1900 introduit et généralise la **notion de neurone** (cellule nerveuse), faisant du tissu nerveux un tissu comparable aux autres.
- Un **organisme complexe** est constitué de **tissus** possédant **différentes fonctions**, eux-mêmes formant des **organes spécialisés** .

Théorie cellulaire

- La cellule est l'unité constitutive des organismes vivants. Elle en est aussi l'unité fonctionnelle.
- L'organisme dépend de l'activité des cellules isolées ou groupées en tissus pour assurer les différentes fonctions.
- Les activités biochimiques des cellules sont coordonnées et déterminées par certaines structures présentes à l'intérieur des cellules.
- La multiplication des cellules permet le maintien des organismes et leur multiplication.

Tissu nerveux

**Cellules nerveuses =
Neurones**

Organisme
Organes
Tissus

Coeur

Tissu cardiaque (myocarde)

Organisme

Organes

Tissus

Cellules (se différencient pour former des tissus et des organes spécialisés)

+ Matrice extracellulaire
Organites

**Molécules biologiques (Protéines ,
lipides, Glucides)**

Figure 1. La hiérarchie du vivant

Il existe deux grands types d'organismes:

Les Procaryotes (du grec, pro, avant et karyon, noyau) = êtres vivants unicellulaires, caractérisés par une absence de noyau et d'organites.

Les Eucaryotes (eu, propre) = êtres vivants uni ou pluricellulaires, possédant un noyau et des organites.

Les divisions du vivant

Cellules procaryotes: les bactéries & cyanobactéries

- L'étude des **bactéries** s'est surtout développée au XIXème siècle, avec les travaux de Louis Pasteur (France) et de Robert Koch (Allemagne). Le terme « procaryote » trouve toute sa signification dans les années 1950, lorsque le **microscope électronique** montre l'absence de noyau vrai dans la cellule.
- La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique (= le peptidoglycane). Les bactéries les plus grosses mesurent plus de 2 µm.
- Les bactéries présentent de nombreuses formes: sphériques (coques), allongées ou en bâtonnets (bacilles), des formes plus ou moins spiralées.
- L'étude des bactéries est la bactériologie, une branche de la microbiologie.

Coques

Spirilles

Bacilles

Streptocoque

Staphylocoque

Treponema pallidum

Angines

Panaris

Syphilis

Salmonelles (*Salmonella typhimurium*)

Les bactéries sont ubiquitaires et sont présentes dans tous les types de biotopes rencontrés sur Terre:

- sol,
- eaux douces, marines ou saumâtres,
- air,
- peau et intestin des animaux.

Les bactéries ont une importance considérable dans les cycles biogéochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de l'azote de l'atmosphère.

**Cellule Procaryote : Bactérie de type bacille (*Escherichia coli*)
observée en microscopie électronique à transmission (x 35 000)**

paroi
bactérienne

flagelles ou cils

membrane
plasmique

cytoplasme
contenant une
"zone nucléaire"

Structure cellulaire

- Les bactéries possèdent :
 - un chromosome circulaire sous forme de filament d'ADN.
 - des molécules d'ADN circulaire extra-chromosomiques (= plasmides).
 - de nombreux ribosomes.
 - des substances intracellulaires de réserve (dans le cytosol).

Cyanobactérie = cyanophycée

- procaryote photoautotrophe de coloration bleue-verte ou violet sale, capable de photosynthèse (utilisent et exploitent l'énergie de la lumière), contrairement aux hétérotrophes (bactéries, protozoaires, zooplancton, mammifères) qui ne peuvent pas produire leur propre matière organique à partir de l'énergie solaire.

Cellules eucaryotes

- Organismes unicellulaires:
- Leur diversité est très grande :
 - algues unicellulaires (phytoplancton),
 - levures (champignons)
 - Paramécies (protozoaires).
- Organismes pluricellulaires:
Formés d'une communauté de cellules interdépendantes

CELLULES EUCARYOTES:

- Organismes unicellulaires:

**algues
unicellulaires
(phytoplancton)**

**levures
(champignons)**

**Protozoaire:
Paramécie**

Amibe : Amoeba proteus

= êtres vivants unicellulaires **eucaryotes** anciennement classés parmi les Protozoaires.

Elles sont caractérisées par un **corps cellulaire déformable** émettant des **pseudopodes** (prolongements de forme changeante), qui leur permettent de **ramper** sur un support ou de capturer des proies microscopiques par **phagocytose**.

= **espèces** libres vivant des les eaux, les sols humides, certaines peuvent être à l'origine de **pathologies** diverses.

levure

Saccharomyces cerevisiae (Image en microscopie électronique)

= **champignons microscopiques unicellulaires** (ou très faiblement pluricellulaires) qui se multiplient par **bourgeonnement**.

Elles ont la capacité de fermenter des matières organiques, minérales ou végétales pour produire des substances variées (pain, bière ...).

L'activité chimique des levures provoque le dégagement de bulles de gaz carbonique et fait lever la pâte à pain.

- Organismes pluricellulaires

Structure d'une cellule eucaryote animale

Un ovule entouré de spermatozoïdes

Le matériel génétique est dans la tête du spermatozoïde. Il entre dans l'ovule tête première.

Cellule humaine: muqueuse buccale. Colorée à l'eau iodée.

Cellules sanguines humaines: les hématies (Globule rouges)

Cellules sanguines humaines: les leucocytes (Globules blancs)

Cellule végétale

Virus H1N1 de la grippe porcine

Virus(HIV) : Immunodéficience Humaine

virus

Particule microscopique infectieuse qui nécessite une [cellule hôte](#) pour se [multiplier](#).

Un **virus** se caractérise par son incapacité à se multiplier seul par division.

Il a besoin d'utiliser une cellule hôte : un virus est un parasite intracellulaire obligatoire.

Il est composé d'une ou plusieurs molécules d'ADN, ou d'ARN entourées d'une coque de protéines, appelée la capside, et, parfois, d'une enveloppe.

UE2 : Structure générale de la cellule

Chapitre 7 : Structure de la cellule

Le noyau cellulaire

Professeur Michel SEVE

Année universitaire 2010/2011

Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Structure du noyau

- Le noyau est un compartiment séparé par une membrane communiquant avec le cytosol par des pores
- Toutes les macromolécules entrent et sortent par des mécanismes actifs de transport
- Le noyau n'est pas homogène:
 - territoires chromosomiques
 - Nucléole: zone de transcription des gènes des ARNr
 - Corps de Cajal: régulation et assemblage des snARN
 - Granules (speckles): lieu de maturation, épissage

Structure du noyau au microscope électronique

Relations du noyau avec les structures cellulaires

La membrane nucléaire

- Deux bicouches lipidique: membrane interne et membrane externe
- Espace périnucléaire de 30 nm
- Armature interne de protéines: les lamines (disparaît lors de la mitose) en interaction avec la chromatine
- Pores nucléaires

Réseau de lamine observé au microscope électronique

Structure de la membrane nucléaire

Lamins	Arps	G-actin	Oligomeric actin
mRNA	Profilin	Transcription factors

Recrutement
De membrane

Fusion de membrane
Assemblage du pore

Reformation de
la membrane
nucléaire durant
la télophase

Structure de la membrane nucléaire au cours du cycle cellulaire

Les pores nucléaires

- Machinerie complexe et régulée
- Formée de protéines les nucléoporines
 - - Les protéines qui entrent dans le noyau ont une séquence de localisation nucléaire (SLN)
 - *exemple: PKKKRKV*
 - Les protéines qui sortent du noyau ont une séquence d'export nucléaire ou sont liés à des ARN
- - Les importation de protéines et d'ARN se font grâce à des protéines d'échange:
 - *Exemple: importines*

Le pore nucléaire et la membrane nucléaire

Structure du pore nucléaire

Observations du pore nucléaire en microscopie électronique

Transport des protéines à travers le pore nucléaire

Transport des protéines à travers le pore nucléaire

nécessite

NLS: « Nuclear Localization Signal »
=Signal de localisation Nucléaire

Pyruvate kinase

Sans NLS

Avec NLS

n: noyau

Importine et Exportine

Cycle d'importation

Cycle d'exportation

Sortie des ARN grâce au mARN exporter

STRUCTURE DE LA CHROMATINE

Résumé des niveaux de compactage de la chromatine

— Interphase —

— Mitose / Méiose —

Observation au microscope électronique de la chromatine

A = Fibre de 30 nm d'un chromosome à l'interphase

B = Nucléosomes le long d'une fibre d'ADN

Aspect en collier de perle = «Moniliforme»

Structure de la chromatine

(A)

10 μm

En interphase

(B)

1 μm

• **Au cours de la mitose**

Structure d'un chromosome

L'armature de protéines du chromosome

Condensation de la chromatine

- A l'interphase:
 - **Hétérochromatine**: Chromatine très condensée
 - Transcription Inactive
 - **Euchromatine**: Chromatine peu condensée
 - Transcription Active

La chromatine à l'interphase

Cellules HeLa à l'interphase
Microscopie à contraste de phase

Chromatine à l'interphase
Coloration au Hoechst 33258
Microscopie à Fluorescence

La chromatine condensée est absente près des pores nucléaires

Territoires chromosomiques (1)

Chromosome
painting

Territoires chromosomiques (2)

Le nucléole (1)

Le nucléole (2)

Le nucléole contient la partie du chromosome appelé Nucleolar organiser (NO) et qui contient les gènes des rARN

Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées à l'université Joseph Fourier de Grenoble.

L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits en 1^{ère} année de Médecine ou de Pharmacie de l'Université Joseph Fourier de Grenoble, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

LE NOYAU CELLULAIRE

Pr. Boutaina BELQAT

Définition

Le noyau est un **organite**, présent dans les **cellules eucaryotes**, et contenant le matériel **génétique** de la cellule (ADN).

Il a deux fonctions principales :
- contrôler les réactions chimiques du **cytoplasme** et,

- stocker les informations nécessaires à la **division cellulaire**.

- ✿ Il a un diamètre variant de 5 à 7 micromètres, ce qui fait de lui le plus grand des organites.

Membrane nucléaire

La lamina nucléaire = réseau protéique fibreux, qui double la membrane interne de l'enveloppe nucléaire formant une couche de 10 à 20 nm d'épaisseur et interrompue par des pores nucléaires.

Rôle de la lamina

- ***La lamina:***
 - ***donne sa forme au noyau,***
 - ***rend rigide l'enveloppe nucléaire et,***
 - ***joue un rôle dans le disparition et la reconstitution de la membrane nucléaire lors de la division cellulaire***
 - ***sert aussi à la fixation des chromatides à la périphérie du noyau***

Le nucléoplasme

Le nucléoplasme est un liquide de consistance gélatineuse (qui apparaît grisâtre ponctué de noir en microscopie électronique) contenu dans le noyau délimité par l'enveloppe nucléaire.

- ✿ Il contient en moyenne entre 70 % et 90 % d'eau et son pH est proche de 7.

Le nucléoplasme

- ✿ Le nucléoplasme contient:
 - ✿ nucléotides triphosphates,
 - des [enzymes](#),
 - ✿ des protéines et des facteurs de transcription.

Il renferme la quasi totalité de l'[information génétique](#) (2 mètres d'[ADN double brin](#) enfermé dans la [chromatine](#) (complexe ADN-protéines)).

La transcription de l'ADN en ARN pré-messager se déroule dans le nucléoplasme

- L'acide ribonucléique messenger, ARN messenger ou ARNm est une copie transitoire d'une portion de l'ADN correspondant à un ou plusieurs gènes.
- L'ARNm est utilisé comme intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines.

Chromatine

La chromatine est la forme sous laquelle se présente l'ADN dans le noyau.

C'est la substance de base des chromosomes eucaryotes, elle correspond à l'association:

ADN + ARN + Protéines

Les protéines sont de deux types :

- histones (protéines très riches en aa basiques) et,
- protéines non-histones, non liées à l'ADN.

Il y a deux types de chromatine : l'euchromatine et l'hétérochromatine.

Les **nucléosomes** = Enroulement de l'**ADN** autour de disques protéiques octamères (assemblage de 8 molécules d'**histones** H2A, H2B, H3 et H4)

Ils constituent une structure en collier de perles.

Avec l'addition d'histones H1, le filament nucléosomique, appelé aussi la **fibre de 10 nm** est à son tour compacté sous forme de **fibres de 30 nm** de diamètre, constituant l'**unité de base de la chromatine**.

Deux types de chromatine

- *L'**euchromatine**, qui consiste en ADN actif, de structure globalement décondensée permettant l'expression génique.*

- *L'**hétérochromatine**, régions d'ADN condensé qui consiste en ADN principalement inactif. Il semble servir à des fins structurelles durant les phases chromosomiques.*

Différents niveaux de condensation de l'ADN

Differents niveaux de condensation de l'ADN. (1) Single DNA strand. (2) Chromatin strand (DNA with histones). (3) Chromatin during interphase with centromere. (4) Condensed chromatin during prophase. (Two copies of the DNA molecule are now present) (5) Chromosome during metaphase.

= un **organite** cellulaire **eucaryote situé** dans le noyau. *Il n'est pourtant pas entouré d'une membrane lipidique et n'est donc pas séparé physiquement du noyau.*

*Il est observable au **microscope optique** et électronique et disparaît au cours de divisions cellulaires.*

Fonction du nucléole

Bon courage

LIENS UTILES 🙌

Visiter :

1. <https://biologie-maroc.com>

- Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF Gratuit)

2. <https://biologie-maroc.com/shop/>

- Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
- Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et géologues.
- Trouver des bourses et des écoles privées

3. <https://biologie-maroc.com/emploi/>

- Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation, demandes de ...
- Trouver des offres d'emploi et de stage